

## פרוטוקול טיפול בפרות קשות התעברות

פרות מחזוריות שלא התעברו ב3 ההזרעות הראשונות, בדרישה לאחר ההזרעה השלישית הפרה לא תוזרע בדרישה אלא תגיע לביקור הרופא הקרוב לבדיקת תקינות מערכת המין, ובדיקה כללית לשלילת דלקת כלשהי באיברי הפרה. במקרה שהכל תקין הפרה תתחיל פרוטוקול אובסינק שבוע (יום 7) לאחר הדרישה (1 סמ"ק גונבריד לשריר – לאחר שבוע (יום 14) 2 סמ"ק אסטרוט – לאחר יומיים בצהריים (יום 9; כ-16 שעות לפני הזרעה) 1 סמ"ק גונבריד- ויום למחרת (יום 10) הזרעה. את הזריקות יש לתת במזרק חד פעמי בנפח 5 סמ"ק עם מחט G18 (ורודה) ארוכה (1.5") לשריר הצוואר לפרה מרוסנת בעול. בנוסף להזריע עם זרמת פרים לקשות התעברות. צריך לזכור שאי אפשר להבטיח שהפרה תתעבר כתוצאה מפרוטוקול זה. אך בטוח שהשימוש בפרוטוקול מעלה את הסיכויים של הפרה להתעבר.

בהצלחה,  
ד"ר שקד דרוקר  
מנהל מקצועי  
שיאון

